



LEEFGEBIED OPEN AKKER

De akkerranden en vogelakkers staan er op veel plaatsen in ons werkgebied kleurig voor. Er is veel tijd en aandacht besteed aan de inzaai, aanleg en het onderhoud van het agrarisch natuurbeheer. Hier en daar zijn er spandoeken in het beheer geplaatst voor een goede PR en meer naamsbekendheid.



NOG EEN PAAR AANDACHTSPUNTEN

Het beheer in leefgebied open akker is alleen bedoeld voor heel veel soorten akkervogels. Alhoewel de insecten en andere fauna ook mee profiteert van het beheer. Het beheer is belangrijk voor twee beheerfuncties die beschreven staan in het natuurbeheerplan van Provincie Fryslân. De beheerfuncties zijn:

1. Optimaliseren voortplanting (zorgen voor nestgelegenheid, rust en voedsel tijdens broedperiode)
2. Creëren foerageergebied (aanbieden van voedsel gedurende winterperiode voor doortrekkende en overwinterende vogelsoorten)

Om aan deze twee beheerfuncties te kunnen voldoen dient de hele oppervlakte van het aangevraagde perceel te bestaan uit de voorgeschreven gewassen. Elementen die daar niet in thuis horen willen we daar dan ook niet in aantreffen. Dus geen opslag van kuilpakken, bokashibulten en uitkijktorens. Wanneer dergelijk elementen wel worden aangetroffen tijdens de schouw of een andere controle gaat dit ten koste van de oppervlakte natuurbeheer. Dit kan in extreme gevallen consequenties hebben voor uw en ieders vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Indien zich dit gedurende het seizoen wel voordoet willen we u vragen dit door te geven aan de gebiedscoördinator Reinskje Brandsma. Ook bij twijfel over beheerzaken contact opnemen met Reinskje of mailen naar het collectief [collectief \[collectiefwaadrane@hotmail.com\]\(mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com\)](mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com).

Voordat u **de eiwitstroken** (luzerne, gras/klaver) maait **moet** u contact opnemen met uw vogelteller. Immers hij weet of er vogels broeden in uw perceel. Stem af en overleg, deze samenwerking is van groot belang in het agrarisch natuurbeheer.

Indien dit niet gebeurt moeten wij als collectief sanctiemaatregelen opleggen. Hoe later maaien hoe beter en misschien is het een idee om niet alle stroken tegelijk te maaien. Ook bestaat er de mogelijkheid van Sinusmaaien. Daarbij worden de stroken in een slingervorm gemaaid, waarbij tijdens elke maaibeurt stukken worden overgeslagen. Daar blijven dus nectarbronnen aanwezig en kunnen de vlinders naar uitwijken. Zie ook meegestuurde informatie over sinusmaaien. Verder willen wij u nog adviseren om bij het maaien een bloter te gebruiken in plaats van een klepelmaaier. Een bloter kunt u hoger afstellen zodat er meer gewas blijft staan dit heeft een positief effect op insecten.

Leg **de braakstroken** (kruiden-granen en bloemen) naast de sloot. Zodat de overgang naar de sloot zo natuurlijk mogelijk is. Klepel de slootkanten niet langs de vogelakker en de kruidenrijke akkerrand, in ieder geval niet in het broedseizoen. Immers veel kleine zangvogels en eenden broeden in de slootkanten. Beheer is gericht op vogels, dus daar is veel winst te halen.

Van de braakstroken (kruiden, granen en bloemen) wordt jaarlijks maximaal 50% gemaaid en wel na 1 augustus. Hierbij kan men ook de methode van sinusmaaien toepassen. Dit werkt positief voor insecten met name vlinders.

Schouw. Vorig jaar is er voor de eerste keer een schouw uitgevoerd door de schouwcommissie. Van de bevindingen heeft u allemaal schriftelijk bericht gehad. We gaan er vanuit dat u de aanbevelingen uit de schouw hebt uitgevoerd/verbeterd. Dit jaar zal er weer een schouw plaatsvinden. De bevindingen van deze schouw hebben niet alleen maar meer een adviserend karakter. Voor de beheerders die dit jaar voor het eerst meedoen aan ANLB-beheer is de schouw nog wel adviserend.

We beseffen dat jullie er veel tijd en energie in hebben gestopt maar nu de randen gaan bloeien is het goed om eens zorgvuldig naar het beheer te kijken. Natuurlijk allereerst om te genieten en te aanschouwen wat er leeft. Een voordeel van dergelijke eigen schouw is ook dat kleine haarden probleemonkruiden als akkerdistel, hanepoot en eerder worden opgemerkt en (handmatig) kunnen worden verwijderd. Immers één jaar onkruid laten staan is zeven jaar uit wieden gaan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en gebiedscoördinatoren
Agrarisch Collectief Waadrâne

